

【レジメン概要】肝胆膵

改定日 2022.2.4

※ご注意※ このデータは最新版ではない場合があります。

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール
胆道(切除不能・再発) GEM 1000mg/m ²	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	day1.8.15	28日
膵(術後補助) GEM 1000mg/m ²	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	day1.8.15	28日
膵(切除不能・再発) GEM 1000mg/m ²	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	day1.8.15	28日
膵(切除不能・再発) FOLFIRINOX	オキサリプラチン レボホリナート カンプト 5-FU(bolus) 5-FU(div)	85mg/m ² 200mg/m ² 180mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	120分 120分 90分 全開 46時間	day1 day1 day1 day1 day1-3	14日
膵(切除不能・再発) GEM+nab-PTX	アブラキサン ゲムシタピン	125mg/m ² 1000mg/m ²	30分 30分	day1.8.15 day1.8.15	28日
胆道(切除不能・再発) GS (Gemcitabine+S-1)	ゲムシタピン エスエーワン	1000mg/m ² 減量投与量 ^{※2}	30分 1日2回 内服	day1.8 day1夕-day15朝	21日

※2 S-1減量投与量 (1段階減量) BSA1.25m²未満 30mg/回(60mg/2x) → 20mg錠 朝2T・夕1T不均等内服
BSA1.25m²以上1.5m²未満 40mg/回(80mg/2x)
BSA1.5m²以上 50mg/回(100mg/2x)